



- Colza**
 - Charançon du bourgeon terminal : Traiter.
 - Pucerons : Quelques colonies.
 - Phoma : Présence de macules.
- Céréales** - Pucerons et cicadelles : Traitements inutiles.
Continuer à surveiller.
 - Limaces : Rester vigilant.

Colza

Les colzas sont entre les stades 6 à 8 feuilles.

Charançon du bourgeon terminal

Les captures sont généralisées sur toute la région. Intervenir rapidement si les traitements n'ont pas encore été réalisés.

Pucerons

Quelques colonies de pucerons verts et cendrés sont observées dans les parcelles non traitées. Le seuil de 20 % de pieds colonisés n'est pas atteint. Attendre pour toute intervention spécifique. Le traitement contre le charançon du bourgeon terminal est également actif sur les pucerons.

Phoma

De nombreuses macules de Phoma sont observées actuellement dans les colzas. Aucune efficacité des traitements fongicides d'automne n'a été mise en évidence dans les expérimentations réalisées en Lorraine durant les années précédentes. Aussi, nous déconseillons toute intervention spécifique.

Céréales

Pucerons

La situation a peu évolué cette semaine (2 à 3 % de pieds colonisés), alors que les céréales se développent lentement, les plus avancées étant au stade 3 feuilles.

Dans ces conditions, il est généralement inutile d'intervenir. Surveiller régulièrement (tous les 2 à 3

jours) les parcelles de blé et orge, surtout si elles sont actuellement au stade 2 - 3 feuilles. Cette vigilance sera d'autant plus nécessaire si les températures s'élèvent dans les prochains jours.

Les préconisations de nos derniers bulletins restent valables.

Cicadelles

Avec le froid, les captures en cuvette jaune se sont arrêtées.

Les traitements sont généralement inutiles.

Continuer à surveiller.

7408

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION RÉGIONALE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél. : 83.30.41.51

